

ATMINTINĖ: MAITINIMAS PER GASTROSTOMĄ

	<i>Amžius</i>	<i>Pradinis maitinimas</i>	<i>Didinimas</i>	<i>Maksimumas</i>
<i>Pastovus maitinimas</i>				
	Neišnešioti	0.5-2 ml/kg/val	0.2-1 ml/kg/val	4-8 ml/kg/val
	0-1 metai	1-2 ml/kg/val (10-20 ml/val)	1-2 ml/kg/val (5-10 ml/8 val)	5-6 ml/kg/val (20-55 ml/val)
	2-6 metai	2-3 ml/kg/val (20-30 ml/val)	1 ml/kg/val (10-15 ml/8 val)	4-5 ml/kg/val (70-90 ml/val)
	7-14 metai	1 ml/kg/val (30-40 ml/val)	0.5 ml/kg/val (15-20 ml/8 val)	3-4 ml/kg/val (110-130 ml/val)
	>14 metai	30-60 ml/val	0.4-0.5 ml/kg/val (25-30 ml/8 val)	125-150 ml/val
<i>Pertraukiamas maitinimas</i>				
	Neišnešioti	1-5 ml/kg/2 val	0.5-2 ml/kg kiekvieną maitinimą	120-175 ml/kg /dieną
	0-1 metai	10-15 ml/kg/maitinimas (60-80 ml/4 val)	10-30 ml/maitinimas (20-40 ml/4 val)	20-30 ml/kg/maitinimas (80-240 ml/4 val)
	2-6 metai	5-10 ml/kg/maitinimas (80-120 ml/4 val)	30-45 ml/maitinimas (40-60 ml/4 val)	15-20 ml/kg/maitinimas (280-375 ml/4-5 val)
	7-14 metai	3-5 ml/kg/maitinimas (120-160ml/4 val)	60-90 ml/maitinimas (60-80 ml/4 val)	10-20 ml/kg/maitinimas (430-520 ml/4-5 val)
	>14 metai	3 ml/kg/maitinimas (200 ml/4 val)	100 ml/maitinimas	500 ml/4- 5 val

Prieš ir po maitinimo:

- *gastrostominis vamzdelis palaikomas atviras 5-10min.*
- *gastrostominis vamzdelis praplaunamas su šiltu skysčiu po 5-30ml, ne rečiau kaip kas 4 val.*